

با بیاتین نقره زخم‌های پای دیابتی را
با اطمینان درمان کنید.

به همین سادگی!


ترکیبی منحصر به فرد از کنترل اگزودا و
رها سازی تدریجی نقره

بیاتین نقره ترکیبی از جذب موثر آگزودا و اثر اثبات شده در کنترل عفونت موضعی زخم

"اگر بیمار بودم، بدنبال محصولی می‌گشتم که بهترین مدارک را در خصوص تاثیر مثبت درمانی می‌داشت. بیاتین نقره تنها محصولی است که در باره آن چنین دقیق مطالعه شده است."
دکتر رابرت کرسنر دانشیار دانشگاه میامی ایالات متحده آمریکا، ۲۰۰۵

شواهد بدست آمده از مطالعات اثبات کرده‌اند که بیاتین نقره

- در زخم‌های پای دیابتی با علائم عفونت موضعی، سبب کاهش سطح زخم به میزان ۵۶٪ در عرض ۴ هفته شده است.^۱
- در عرض ۱ هفته بوی زخم را کاملا از بین برده یا به میزان بسیار زیادی کاهش می‌دهد.^{۱،۲}
- بهترین کنترل کننده آگزودا است.^{۱،۳}
- در مقایسه با محصولات مشابه خیس خوردگی پوست اطراف زخم را به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌دهد.^{۱،۳}
- حتی بعد از ۱۲ هفته استفاده، مشکلی برای بیمار بوجود نمی‌آورد.^۴



Biatain Ag Documentation

Reference	Type of study	Aim of Study	No. of Patients (N) / Indications
1. Rayman G et al. British Journal of Nursing 14 (2) 2005	Non-comparative	Safety and performance	N=27 Diabetic foot ulcers (Wagner Grade I and II)
2. Münter K. et al. Journal of Wound Care 15 (5) 2006	Randomised, comparative real-life study	Compare efficacy of Biatain Ag with local best practice	N=619 Ulcers of various aetiologies
3. Tentolouris, N. et al. Poster, DFSG 2005	Randomised, comparative real-life study	Compare efficacy of Biatain Ag with local best practice	N=98 Diabetic foot ulcers (Wagner Grade I – III)
4. Baños AMG et al. Poster, EWMA 2008	Prospective, non-comparative clinical study	Safety and performance over 12 weeks	N=375, Ulcers of various aetiologies

برای یافتن مدارک بیشتر در خصوص موارد بالینی، آزمایشگاهی و اقتصادی محصولات درمان زخم کلوپلاست به وب سایت زیر مراجعه نمایید:

www.woundcare.coloplast.com